homme 69 ans ; antécedent de cure chirurgicale d'une hernie inguinale oblique externe droite , 2 ans auparavant.
tableau clinique d'abdomen urgent avec syndrome occlusif du grêle
Quels sont les principaux items sémiologiques à retenir sur les images présentées

obs. Docteur Sylvie Béot ancienne ACC Imagerie médicale Nancy Est
Clinique Louis Pasteur Essey-les-Nancy





hernie inguinale oblique externe droite à contenu épiploïque

anses grêles jéjunales distales en distension liquidienne; anses iléales proximales en disposition "sac-like" sphérique dans le pelvis , en situation antérieure . Le grêle d'aval (iléon distal) est plat

la vessie à une forme "en corne de taureau"; sa partie antérieure se moule sur la paroi postérieure du "sac" d'anses herniaires

hamed
'7
HI
GCS de
INTEGRATIC
MPR CORO ABDO (CrÃ@ateurÂ :synapse_U771593, NÂ
07/10/2
A
DI

hamed
'7
HI
GCS d
INTEGRATIC
MPR CORO ABDO (CrÃ@ateurÂ :synapse_U771593, NÂ
07/10/2
A
D
26
F
I
cm



la totalité du jéjunum est le siège d'une distension liquide jusqu'au niveau du "sac" dont l'enveloppe mince est très facilement analysable

du côté droit , on identifie sans peine le grand omentum engagé ave une anse iléale plate dans une hernie inguinale oblique externe

du côté gauche , on note une petite déhiscence herniaire oblique externe

MPR SAG ABDO (CrÄ©ateurÂ :synapse_U771593,
F
cm

MPR SAG ABDO (CrÄ©ateurÂ :synapse_U7715
22
F

l'effet de masse du sac des anses grêles herniées sur la paroi antéro-inférieure de la vessie confirme que les 2 structures sont dans la même "loge" sous-péritonéale pelvienne antérieure ,

la hernie se développe donc dans l'espace de Retzius




F





F







les hernies supravésicales sont parmi les plus rares des hernies internes

elles se rencontrent préférentiellement chez l'homme , après 50 ans .

ce sont presque toujours des hernies acquises , associées de façon non exceptionnelle à des hernies inguinales

Elles se développent dans la fossette supravésicale , l'orifice d'entrée se situant entre l'ouraque et les cordons fibreux résiduels des artères ombilicales.Les anses herniées se dilatent dans l'espace de Retzius

le "sac herniaire" est en fait constitué

-en arrière par le péritoine pelvien , le péritoine pariétal antérieur et la face antérieure ou antéro-latérale de la vessie ,

-en avant par le fascia transversalis qui recouvre la face profonde ostéo-musculaire du pelvis

ce n'est donc pas un sac péritonéal à proprement parler

hernies supra vésicales

hernie pré vésicale

hernie latéro ou para vésicale



Les hernies internes de l'abdomen , à propos de 14 cas
D. GULLINO, O. GIORDANO, E. GULLINO
J. Chir 1993,130,179-95

hernie rétro vésicale

hernie sus intra vésicale

Elles peuvent aussi se développer latéralement lorsque la laxité du tissus cellulo-graisseux sous péritonéal pré-vésical le permet et sont alors désignées sous le terme de hernie supravésicale externe ou hernie latéro-vésicale . Une variété interne correspond au développement d'arrière en avant dans un plan parasagittal de la hernie en position sus vésicale



F

cas compagnon: occlusion intestinale aiguë hyperalgique chez un homme de 48 ans

obs. IN. Phi Saigon







hernie interne
supra vésicale
avec nécrose ischémique du
grêle incarcéré



l'effet de masse sur la vessie des anses distendues rassemblées en "sac-like" est particulièrement bien montré par les empreintes arciformes sur les contours antérieurs de la vessie

obs. IN. Phi Saigon

messages à retenir

les hernies internes pelviennes sont rares et de difficulté diagnostique variable

les hernies de la fossette supravésicale sont assez caractéristiques par la disposition "sac-like "des anses pelviennes distendues et l'effet de masse qu'elles entraînent sur les parois vésicales, témoin de la cohabitation forcée de ces 2 structures dans un espace inextensible .Ces éléments sémiologiques facilement reconnus



le tableau révélateur est toujours hyperalgique en raison des phénomènes de striction vasculaire



la réparation chirurgicale de la brêche péritonéale après réduction de la hernie et résection des segments ischémiés peuvent être réalisés sous coelioscopie



PanAfrican Medical Journal

Open Access

Case report

Internal supravesical hernia - a rare cause of intestinal obstruction: report of two cases

Mahdi Bouassida[1,&], Selim Sassi[1], Hassen Touinsi[1], Helmi Kallel[1], Mohamed Mongi Mighri[1], Fathi Chebbi[1], Mechaal Ben Ali[3], Khaled Bouzeidi[2], Sadok Sassi[1]

[1]Department of surgery, Mohamed Thahar Maamouri Hospital, Nabeul, Tunisia, [2]Department of radiology, Mohamed Thahar Maamouri Hospital, Nabeul, Tunisia, [3]Department of reanimation, Mohamed Thahar Maamouri Hospital, Nabeul, Tunisia