



jeune femme de 29 ans lourds antécédents :

- **déficit immunitaire combiné** compliqué de dilatation des bronches diffuses avec sanction chirurgicale en 1994
(*pneumectomie gauche*)
- **cholangite sclérosante**

clinique : cholestase, ictère et altération de l'état général

quels sont les principaux items sémiologiques à retenir sur le scanner








dilatation des VBIH en relation avec un processus expansif tissulaire développé sur toute la longueur du pédicule hépatique

la masse pédiculaire a des contours réguliers, son rehaussement est faible . Elle refoule mes vaisseaux '(tronc coeliaque) et le pancréas céphalique sans les infiltrer

des adénopathies sont visibles, para-aortiques et inter aortico-caves




les reformations dans l'axe Z objectivent parfaitement les limites externes régulières de la masse pédiculaire et la persistance d'une lumière canalaire perméable


SLP

SLP


SLP



les séquences pondérées T2 permettent un bilan canalaire biliaire complet et précis



les séquences pondérées T1 avant puis après injection
démontrent l'intégrité de l'interface tumeur-pancréas cépalique




les séquences pondérées T1 muùtiphasiques après injection
n'apportent pas d'autre élément significatif

3 biopsies transpariétales négatives en première lecture :

tissu fibreux; peu de cellularité

imposent le recours à des biopsies chirurgicales qui révèlent la présence de cellules de Reed-Sternberg autorisant le diagnostic de



lymphome malin de type hodgkinien
des voies biliaires

les causes d'ictère dans la maladie de Hodgkin sont multiples:



- obstruction biliaire
- hémolyse
- infiltration lymphomateuse hépatique
- toxicité médicamenteuse
- hépatite virale
- "vanishing bile duct syndrome" ou ductopénie paranéoplasique

Atteintes lymphomateuses de l'arbre biliaire

- ✓ Localisation extra-ganglionnaire rare
- ✓ Simule le cholangiocarcinome
- ✓ Extension le long des voies biliaires

Développée aux dépends du MALT
(mucosa-associated lymphoid tissue)

l'aspect macroscopique :masse peu vascularisée, homogène, à contours réguliers , refoulant les structures anatomiques au contact (y compris les vaisseaux) sans les envahir, adénopathies locales , est souvent évocateur



Atteintes lymphomateuses de l'arbre biliaire


Lymphome non hodgkinien beaucoup plus fréquent que la maladie de Hodgkin

surtout LMNH B diffus à grandes cellules et MALT +++

Associations :

cholangite sclérosante / lymphome biliaire

décrite dans le cadre du SIDA



Case Reports in Medicine
Volume 2013 (2013), Article ID 259642, 5 pages
<http://dx.doi.org/10.1155/2013/259642>

Case Report

Obstructive Jaundice as an Initial Manifestation of Non-Hodgkin Lymphoma: Treatment Dilemma and High Mortality

Dhara Chaudhari,¹ Sarah Khan,¹ Atif Saleem,² Tamarro Taylor,³ Chakradhar Reddy,² Thomas Borthwick,² and Mark Young²